

Tablas de apoyo (solo imprimir una, no se tienen que imprimir una por paciente, es para tu guía).

CDC	CD4+	Estadio	A	B	C
	≥ 500 c/μL	1	Asintomático, Infección aguda por HIV o LGP	Síntomas o condiciones clínicas Categoría B	Condiciones indicadoras de SIDA (Categoría C)
	200-499 c/μL	2			
	< 200 c/μL	3			

Síntomas o Condiciones Categoría B	Condiciones Categoría C
<p>Al menos una de las siguientes condiciones sintomáticas presentadas por adultos o adolescentes HIV⁺:</p> <p>A) Condiciones atribuibles a la infección por HIV o sugestivas de un defecto en la inmunidad celular.</p> <p>B) Condiciones cuyo curso clínico o manejo se ve complicado ante infecciones concurrentes por HIV. Por ejemplo:</p> <p>Angiomatosis bacilar, Candidiasis orofaríngea, Candidiasis vulvovaginal persistente o resistente, Enfermedad Inflamatoria Pélvica, Displasia cervical (moderada o severa), Carcinoma cervical in situ, Leucoplaquia vellosa, Púrpura trombocitopénica idiopática, Síntomas inespecíficos crónicos (>38°C o diarrea > 1 mes. Neuropatía periférica Hepes zoster en dos o más ocasiones.</p>	<p>Neumonía bacteriana recurrente (≥2 episodios en 12 meses)</p> <p>Candidiasis en tráquea, bronquios o pulmonar. Candidiasis esofágica. Carcinoma cervicouterino invasor (confirmado por biopsia). Coccidioidomicosis diseminada o extrapulmonar. Criptococcosis extrapulmonar. Criptosporidiosis intestinal crónica (>1 mes de duración) Enfermedad por citomegalovirus (extra hepática, esplénica o ganglionar). Encefalopatía asociada a VIH. Herpes simplex: úlceras crónicas (>1 mes de duración) o bronquitis, neumonitis, o esofagitis. Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar. Isosporiasis intestinal crónica (>1 mes de duración). Sarcoma de Kaposi Linfoma de Burkitt, inmunoblastico, o primario del sistema nervioso central. Complejo Mycobacterium avium (MAC) or M. kansasii diseminado or extrapulmonar. Mycobacterium tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Mycobacterium , otras especies, diseminada o extrapulmonar. Neumonía por Pneumocystis jiroveci (PCP). Leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML). Septicemia por Salmonella recurrente (no tifoidea). Toxoplasmosis cerebral. Síndrome consuntivo secundario a VIH (pérdida ponderal involuntaria >10% del peso basal) asociada a diarrea crónica (≥2 evacuaciones semilíquidas por ≥1 mes) o fatiga crónica y fiebre documentada por ≥1 mes.</p>

Falla Clínica = Condición persistente o empeoramiento. **Falla Inmunológica (CD4)** = Caída de CD4 por debajo de la cifra basal pre-terapia, o Caída de CD4 de al menos 50%, o Niveles de CD4 persistentes <100 cels/μL. **Falla Viroológica** = Carga viral plasmática >10,000 copias/mL.